



Инструкция
по применению Моноспорина для профилактики
дисбактериозов и повышения естественной резистентности
организма животных, в том числе птиц
(организация-разработчик ООО «Биотехагро», г. Тимашевск Краснодарского края)

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Торговое наименование: Моноспорин (Monosporin)

Международное непатентованное наименование: *Bacillus subtilis*

2. Лекарственная форма – суспензия для перорального применения

Моноспорин содержит живые спорообразующие бактерии *Bacillus subtilis* 945 (B-5225) в среде культивирования. В 1 см³ препарата содержится не менее 1x10⁸ КОЕ (колониеобразующих единиц) спорообразующих бактерий.

Моноспорин представляет собой жидкую суспензию от бежевого до коричневого цвета.

3. Моноспорин расфасовывают по 0,4; 1,0; 2,0 дм³ в стерильные контейнеры полимерные для инфузионных растворов, по 0,4 дм³ в стеклянные банки или бутылки. Контейнеры полимерные укупориваются специальной полимерной стерильной пробкой, банки или бутылки укупориваются стерильной резиновой пробкой и обжимаются алюминиевым колпачком.

Каждую единицу потребительской упаковки снабжают инструкцией по применению.

Срок годности препарата – 6 месяцев от даты выпуска при соблюдении условий хранения и транспортирования.

Моноспорин после истечения срока годности не должен применяться.

4. Препарат хранят в упаковке производителя в сухом, чистом, защищенном от света помещении, при температуре от 2° до 10°С.

Моноспорин следует хранить в местах, недоступных для детей.

5. Контейнеры полимерные, стеклянные банки или бутылки с препаратом без маркировки, с истекшим сроком годности, с нарушением целостности и/или герметичности упаковки, содержащие посторонние примеси, с измененным цветом, а также остатки препарата, неиспользованные в течение 3 дней после вскрытия первичной упаковки подлежат выбраковке с последующей утилизацией с бытовыми отходами.

II. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

6. Бактерии *Bacillus subtilis*, входящие в состав препарата, выделяют биологически активные вещества, под воздействием которых активизируются процессы пищеварения, усиливается неспецифический иммунитет, в результате чего нормализуется микробиоценоз кишечника, повышается сохранность поголовья и эффективность выращивания молодняка.

III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

7. Моноспорин применяют для профилактики дисбактериозов и повышения естественной резистентности организма животных, в том числе птиц.

8. Противопоказания не установлены.

9. Препарат назначают животным внутрь индивидуально или групповым методом с питьём (молоком, молозивом, водой) или кормом. Препарат перед употреблением взбалтывают.

Рекомендуемые однократные ежедневные профилактические дозы:

- телятам с 1 по 8 и с 26 по 30 день жизни - 4,0 см³ на животное;
- пороссятам с 1 по 8 день жизни - 2,0 см³ на животное;
- пороссятам за 3 дня до отъема и 3 дня после отъема - 2,0 см³ на животное;
- свиноматкам за 10 дней до опороса в течение 10 дней - 10,0 см³ на животное;
- свиноматкам за 3 дня до отъема поросят в течение 3-х дней - 10,0 см³ на животное;
- цыплятам-бройлерам с 1 по 13 и с 30 по 35 день жизни - 3,0 см³ на 100 голов;
- курам-несушкам яичных и мясных кроссов, уткам со 130 дня жизни в течение 10 дней - 20,0 см³ на 100 голов.

10. При передозировке препарата Моноспорин нежелательных реакций не выявлено.

11. Особенности действия препарата при первом приеме или его отмене не установлено.

12. Специальные меры при пропуске приема одной или нескольких доз препарата не предусмотрены, прерванный курс профилактики продолжают.

13. При применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений не отмечается.

14. Моноспорин не рекомендуется применять совместно с антибиотиками.

15. Продукцию животноводства и птицеводства после применения препарата реализуют без ограничений.

IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

16. При применении препарата следует соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами ветеринарного назначения.

17. Специальные меры предосторожности при работе с препаратом не требуются.

18. При работе с препаратом запрещается пить, курить и принимать пищу. После работы следует вымыть руки с мылом. При попадании на кожу и/или слизистые оболочки их рекомендуется промыть большим количеством водопроводной воды.

19. Организация-производитель ООО «Биотехагро»

(352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Выборная, 68)

Инструкция по применению разработана ООО «Биотехагро» (г. Тимашевск)

С утверждением настоящей инструкции утрачивает действие Инструкция по применению препарата Моноспорин, утвержденная заместителем Руководителя Россельхознадзора 12 мая 2008г.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ»

Номер регистрационного удостоверения 02-1-26.13-1668№ПВР-1-4.7/02099

Генеральный директор
ООО «Биотехагро»



Handwritten signature in blue ink, likely belonging to V.A. Babarykin.

В.А.Бабарыкин