

Рекомендации
по применению пробиотических препаратов
на цыплятах-бройлерах с целью профилактики инфекционных
заболеваний, укрепления иммунитета, улучшения конверсии корма

| Возраст, дни | Наименование препаратов | Дозы и способы введения | |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| 0 день, в инкубатории перед отправкой цыплят в транспортной таре | Пробиотик Моноспорин КД + пробиотик Пролам КД + пшено | 1-1,5 кг на 10 тыс. цыплят | посыпать на цыплят сверху |
| | Пробиотик Моноспорин КД + Пролам КД (1:3) | 25 мл на 100 голов цыплят | крупно-дисперсное опрыскивание цыплят |
| <i>Первый курс</i> | | | |
| 0-1 день | антибактериальные препараты (по показаниям) | В течение 20ч с водой | |
| | комплекс водорастворимых витаминов (гидро рексвитал аминокислоты и др.) | В течение 4 ч с водой | |
| | Пробиотик Моноспорин КД | 0,03 мл/голову в течение 3-4ч с водой | |
| 2 день | Продолжение курса + Моноспорин КД | //-// | |
| 3 день | Продолжение курса + Моноспорин КД | //-// | |
| 4 день | Продолжение курса + витамины комплекса В + Моноспорин КД | //-// | |
| 5 день | Продолжение курса + витамины комплекса В + Моноспорин КД | //-// | |
| 6 день | Пробиотик Пролам КД | 0,1 мл/гол | выпойка в течение 3-4 ч |
| | витамины комплекса В + гидро рексвитал аминокислоты и др. | | после выпойки пробиотика |
| 7-10 день | Пробиотик Пролам КД | 0,1 мл/гол | выпойка в течение 3-4 ч |
| | гидро рексвитал аминокислоты и др. | | после выпойки пробиотика |
| 11-20 день | комплекс водорастворимых витаминов (гидро рексвитал аминокислоты и др.) | с водой | |
| <i>Второй курс применения антибактериальных препаратов (по показаниям)</i> | | | |
| 21-25 день | антибактериальные препараты | с водой | |
| | пробиотик Моноспорин КД | 0,3 мл/гол | выпойка в течение 3-4 ч |
| 26-30 день | гидрорексвитал электролиты и др. | с водой | |
| | пробиотик Пролам КД (СТФ) | 0,1 мл/гол | выпойка в течение 3-4 ч |

Примечание: для повышения усвояемости кормов, улучшения аппетита, нейтрализации микотоксинов с первого дня и до убоя птицы в рацион включать сухую кормовую пробиотическую добавку «Бацелл-М» либо «Бацелл-МТ» из расчёта 2-3 кг/1т корма (0,2%-0,3% ввода).

Главный ветеринарный врач ООО «Биотехагро» Зимин К.В.
8-9284200389; эл.адрес: konstantin.zimin.59@mail.ru
2026г.