

**Рекомендации
по применению пробиотических препаратов на водоплавающей птице
(утки и гуси) с целью профилактики инфекционных заболеваний,
укрепления иммунитета, улучшения конверсии корма**

Возраст, дни	Наименование препаратов	Дозы и способы введения	
0 день, в инкубатории перед отправкой утят, гусят в транспортной таре	Пробиотик Моноспорин КД + пробиотик Пролам КД + кукурузная крупка	1-1,5 кг на 10 тыс. утят, гусят	посыпать на утят, гусят сверху
	Пробиотик Моноспорин КД + Пролам КД (1:3)	25 мл на 100 голов утят, гусят	крупно-дисперсное опрыскивание утят, гусят
1-5 день	Пробиотик Моноспорин КД	0,03 мл/гол	в течение 3- 4 ч методом выпойки с водой
6-10 день	Пробиотик Пролам КД	0,2 мл/гол	- // -
22-28 день	Пробиотик Пролам КД	0,2 мл/гол	-//-
60-64 день	Пробиотик Моноспорин КД	0,1 мл/гол	-//-
65-69 день	Пробиотик Пролам КД	0,4 мл/гол	-//-
90-94 день	Пробиотик Моноспорин КД	0,1 мл/гол	-//-
95-99 день	Пробиотик Пролам КД	0,4 мл/гол	-//-
120-124 день	Пробиотик Моноспорин КД	0,2 мл/гол	-//-
125-129 день	Пробиотик Пролам КД	0,4 мл/гол	-//-
159-163 день	Пробиотик Моноспорин КД	0,2 мл/гол	-//-
164-168 день	Пробиотик Пролам КД	0,4 мл/гол	-//-
198-202 день	Пробиотик Моноспорин КД	0,2 мл/гол	-//-
203-207 день	Пробиотик Пролам КД	0,4 мл/гол	-//-
237-241 день	Пробиотик Моноспорин КД	0,2 мл/гол	-//-
242-246 день	Пробиотик Пролам КД	0,4 мл/гол	-//-
276-280 день	Пробиотик Моноспорин КД	0,2 мл/гол	-//-
281-285 день	Пробиотик Пролам КД	0,4 мл/гол	-//-
315-319 день	Пробиотик Моноспорин КД	0,2 мл/гол	-//-
320-324 день	Пробиотик Пролам КД	0,4 мл/гол	-//-
354-358 день	Пробиотик Моноспорин КД	0,2 мл/гол	-//-

Примечание: для повышения усвояемости кормов, улучшения аппетита, нейтрализации микотоксинов с первого дня и до убоя птицы в рацион включать сухую кормовую пробиотическую добавку Бацелл-МТ из расчёта 2-3 кг/1 т корма (0,2%-0,3% ввода).

Зимин К.В.,
главный ветеринарный врач
ООО «Биотехагро»
тел.8(928)420-03-89,
эл.адрес: konstantin.zimin.59@mail.ru